

Praktiska tips angående antibiotikaintag

Spädbarn kan ofta ges droppar penicillin (Kåvepenin eller synonym) i stället för mixtur, då en dos på 5 ml kan vara svårt att få i barnen.

Dropparna ($\frac{1}{2}$ -1 ml beroende på barnets vikt) sprutas lämpligen med medföljande pipett långt in i munnen (inte på tungspetsen), helst mot bakre svalgväggen eftersom de är kraftigt beska. Den lilla mängden gör att barnet inte spottar utan sväljer. Det är klokt att barnet härefter ammas eller får något gott.

Man kan också ge mixturen eller dropparna i en liten mängd sylt (t.ex. lingonsylt som i sig smakar lite beskt). Att spä ut mixtur eller droppar i välling eller annat flytande brukar inte vara bra eftersom beskheten ändå märks. Att hålla för näsan är också effektivt. Då försvinner lukten och den beska eftersmaken kan fördras lättare. Barn från tre år kan ofta svälja tabletter. Prova med en tablett på mottagningen (ha en provask i skrivbordslådan), låt barnet lägga tablettens själv långt bak på tungan och låt det svälja ner med vatten.

Man kan också lägga små 125 mg tabletter i en kokt makaron som barnet får svälja helt. Det är ofta olämpligt att dela eller krossa tabletterna eftersom den beska smaken slår igenom, liksom då man behåller tablettens för länge i munnen. Sen blir det ofta tvärstopp. Kyla, t.ex. iskallt vatten, är också ett knep att övergående minska smaken på tungan. Choklad rekommenderas av vissa som ger en skyddande hinna på tungan.